

# De Wageningse Methode

## 5&6 VWO wiskunde B


### Uitgebreidere antwoorden Hoofdstuk 4

#### Goniometrie

##### Paragraaf 1 Cirkelbewegingen


- 1 a. De hoogte van het wiel is de y-coördinaat van het hoogste punt van de grafiek, dus 80 cm  
 b. De periode is de omtrek van het wiel =  $80\pi \approx 251,3$  cm  
 c. In één omwenteling van het wiel wordt 0,80π meter afgelegd; 36 km/u komt overeen met 10 m/sec, dus  $0,08\pi \approx 0,25$  s.

- 2 a. Dan is het rad helemaal beneden, dus na  $\frac{3}{4}$  rondje en  $1\frac{3}{4}$  rondje, dus na 45 en 105 sec.  
 b. 11m; vanaf het begin elk half rondje verder, dus na 0, 30, 60, 90, 120 sec.  
 c.




- d.  $\alpha = \frac{1}{6} \cdot 360^\circ = 60^\circ$ ;  
 $H(10) = 11 + 10 \cdot \sin 60^\circ \approx 19,660$   
 e.  $H(35) = 11 - 10 \cdot \sin 30^\circ = 6$   
 f.  $6^\circ$   
 g. Omtrek rad =  $20\pi$  meter, die afstand wordt in 60 sec afgelegd,  $20\pi/60 = \frac{1}{3}\pi$  m/s.

- 3 a. 3  
 b.  $f(100) = f(1) = 2$ ;  $f(-100) = f(2) \approx \frac{1}{2}$




- b. Vanaf  $t=0$  tegen de klok in is de hoogte van de verdeelstrepen:

$0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\sqrt{3}, 1, \frac{1}{2}\sqrt{3}, \frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\sqrt{3}, -1, -\frac{1}{2}\sqrt{3}, -\frac{1}{2}, 0.$



- f. Vanaf  $t=0$  tegen de klok in is de breedte van de verdeelstrepen:

$1, \frac{1}{2}\sqrt{3}, \frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\sqrt{3}, -1, -\frac{1}{2}\sqrt{3}, -\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\sqrt{3}, 1.$



- 5 a.  $\frac{1}{6}\pi$  m/s; 3 keer zo snel, dus  $\frac{1}{2}\pi$  m/s; het kogeltje gaat in 12 sec rond, als de straal  $r$  is, dan wordt dus  $2\pi r$  afgelegd in 12 seconden,  $\frac{1}{6}\pi r$  m/sec, dus  $\frac{1}{6}\pi r = 2\pi$ , dus  $r = 12$ .  
 b. Het kogeltje is rond na  $2\pi$  meter afgelegd te hebben, dat duurt  $2\pi/6 = \frac{1}{3}\pi$  sec, dus  $360^\circ$  in  $\frac{1}{3}\pi$  sec, dat is  $360/\frac{1}{3}\pi = \frac{1080}{\pi}$  °/s

- 6 Een rondje wordt in 2 seconden afgelegd. Als er 120 km/u wordt afgelegd is dat  $120\,000/1800 = 66\frac{2}{3}$  m. De straal is  $66\frac{2}{3}/2\pi \approx 10,61$  m

- 7 a.  $2\pi$  s  
 b. Een hoek van  $60^\circ$ , want daarbij is de koorde gelijk aan de straal.  
 c. 1;  $r$

8

0	30	45	60	90	120	135	150	180
0	$\frac{1}{6}\pi$	$\frac{1}{4}\pi$	$\frac{1}{3}\pi$	$\frac{1}{2}\pi$	$\frac{2}{3}\pi$	$\frac{3}{4}\pi$	$\frac{5}{6}\pi$	$\pi$

- 9 a.  $2\pi$  s  
 b. 1 eenheid/s  
 c. Zo is het gedefinieerd  
 d. De eenheden op de horizontale as.  
 e.  $2\pi$

- 10 a. Ten opzichte van de y-as (dus horizontaal) met factor 2 uitgerekt. Formule is:  $y = \sin \frac{1}{2}x$ .  
 b. Ten opzichte van de x-as (dus verticaal) met factor  $\frac{1}{2}$  ingekrompen. Formule is:  $y = \frac{1}{2}\sin x$

- 12 a. In 5 stappen wordt cirkel 2 keer doorlopen, dus  $T_{\text{step}} = \frac{4\pi}{5}$ ;  $T_{\text{max}} = 4\pi$   
 b. De exacte coördinaten zijn:  $(\cos(k \cdot \frac{4\pi}{5}), \sin(k \cdot \frac{4\pi}{5}))$ , met  $k = 1, 2, 3, 4, 5$ .  
 Dit geeft de punten: (0,309; 0,951); (-0,809; 0,588); (-0,809; -0,588); (0,309; -0,951); (1, 0)

- 13 a.  $x(t) = \cos(-t)$ ;  $y(t) = \sin(-t)$   
 c. Spiegelen in de horizontale as.


- 14 a.  $x(t) = 2 \cos t$ ,  $y(t) = 2 \sin t$   
 c. Ten opzichte van de x-as (=verticaal) vermenigvuldigen met factor 2.

- 15 a. Eenheidscirkel.  
 b. 3 keer zo snel, dus 3 rad/s  
 c. (1, 0)  
 d. Ten opzichte van de y-as (dus horizontaal) vermenigvuldigen met factor  $\frac{1}{3}$ .

- 16 a.  $\begin{cases} x = \cos(t-1) \\ y = \sin(t-1) \end{cases}$   
 c. Eén eenheid naar rechts schuiven.

- 17 a.  $\begin{cases} x = 2 + \cos t \\ y = 3 + \sin t \end{cases}$   
 c. Drie eenheden omhoog schuiven.


- 18 a. Beide middelpunt (-1,4), straal 2 en hoeksnelheid 3 eenheden/s.



- 19 a.  $0, 0, \frac{1}{2}\pi, \frac{1}{4}\pi, \frac{1}{2}\pi$   
 b.  $(2 \cos t, 2 \sin t)$   
 $(1 + 5 \cos 2t, 2 + 5 \sin 2t)$   
 $(\cos(-\pi t + \frac{1}{2}\pi), -1 + \sin(-\pi t + \frac{1}{2}\pi))$   
 $(\cos(t + \frac{1}{4}\pi), \sin(t + \frac{1}{4}\pi))$   
 $(3 + 2 \cos(-3t + \frac{1}{2}\pi), 1 + 2 \sin(-3t + \frac{1}{2}\pi))$

- 20 a. (b, a)  
 b. (0, 1); -; 1 rad/s.  
 c.  $\omega = -1$ ;  $r = 1$ ;  $\varphi = \frac{1}{2}\pi$ ,  $a = b = 0$

- 21 De andere niet rechte hoek in de driehoek is  $90^\circ - \alpha$ .  
 $\sin \alpha = \frac{a}{c}$  en ook  $\cos(90^\circ - \alpha) = \frac{a}{c}$ .  
 $\cos \alpha = \frac{b}{c}$  en ook  $\sin(90^\circ - \alpha) = \frac{b}{c}$ .



- 22  $\omega = -\frac{2\pi}{60} = -\frac{1}{30}\pi$ ,  $\varphi = \frac{1}{2}\pi$   
 $\begin{cases} x = 2\cos(-\frac{1}{30}\pi t + \frac{1}{2}\pi) \\ y = 2\sin(-\frac{1}{30}\pi t + \frac{1}{2}\pi) \end{cases}$


- 23 a. Eenheidscirkel wordt met factor 2 verticaal uitgerekt, je krijgt een ellips met centrum (0, 0),

horizontale as van lengte 2 en verticale as van lengte 4.

- b. Voor alle punten die je krijgt zijn de coördinaten gelijk, dus je krijgt punten op de lijn  $y=x$ , maar niet allemaal, want de cosinus kan alleen waarden tussen -1 en 1 aannemen, dus je krijgt lijnstuk met eindpunten (-2, -2) en (2, 2).

## Paragraaf 2 Parametriseren

- 1 a.  $2\frac{1}{2}, 1\frac{1}{2}, 2$   
 b.  $\begin{cases} x = 2 \\ y = 3 + \frac{1}{2}\sin t \end{cases}$   
 c. De baan is de lijn met vergelijking  $y = \frac{1}{2}x + 2$ .  
 d. Zie e.  
 2 a. De baan is de lijn met vergelijking  $y = x$ .



- 3 P:  $\begin{cases} x = \sin t \\ y = \cos t \end{cases}$   
 Q:  $\begin{cases} x = 2 + \cos(t + \frac{1}{4}\pi) \\ y = \sin(t + \frac{1}{4}\pi) \end{cases}$   
 R:  $\begin{cases} x = \cos(t + 1\frac{1}{6}\pi) \\ y = 2 + \sin(t + 1\frac{1}{6}\pi) \end{cases}$

- 4 a.  $\begin{cases} x = 4\cos(-4\pi t) \\ y = 5 + 4\sin(-4\pi t) \end{cases}$   
 b.  $\begin{cases} x = 4\cos(-4\pi t) \\ y = 4\frac{1}{2} + 4\sin(-4\pi t) \end{cases}$

Cirkel met middelpunt  $(0, 4\frac{1}{2})$  en straal 4.

- 5 a. De omtrek van het wiel is  $72\pi$ , dus een keer rond duurt  $72\pi/6 = 12\pi$  sec  
 b.  $\begin{cases} x = 6t \\ y = 36 \end{cases}$   
 c.  $\begin{cases} x = 6t + 36\sin \frac{1}{6}t \\ y = 36 + 36\cos \frac{1}{6}t \end{cases}$


e. De periode van de beweging is  $12\pi$ . Voor de eerste keer op de x-as halverwege de eerste periode, dus als  $t=6\pi$ ; verder:  $18\pi, 30\pi, \dots$ .  
Bovenin:  $t=0, 12\pi, 24\pi, \dots$

6 Bij de spiraal in de tekening is  $r=t$ .

### Paragraaf 3 Eigenschappen van sinus en co


1 a. Zie plaatje: de lengte van de boog tussen A en B is  $\frac{1}{4}\pi$ , dus van A naar het 'hoogste' punt  $\frac{1}{8}\pi$ .

$t = \frac{3}{8}\pi, 1\frac{3}{8}\pi$   
b.  $\frac{7}{8}\pi, 1\frac{7}{8}\pi$




2  $\frac{7}{8}\pi + k \cdot 2\pi; 1\frac{7}{8}\pi + k \cdot 2\pi$ , met  $k$  geheel.

3 a. (3) en (4) volgen uit de puntsymmetrie tov O.  
(5) en (6) volgen uit symmetrie tov de y-as.




4 a. 1, rechthoekige driehoek met rechthoekszijden  $|\sin t|$ ,  $|\cos t|$  en schuine zijde 1.

5 a.  
b.  $\sin^2 t + (\frac{4}{5})^2 = 1 \Leftrightarrow \sin t = \frac{3}{5}$  of  $\sin t = -\frac{3}{5}$



c.  $\cos(t+\pi) = -\frac{4}{5}$  (spiegelen in O);  
 $\sin(t-\frac{1}{2}\pi) = -\frac{4}{5}$  (een kwartslag met de klok mee draaien)



Je kunt het met plaatjes doen: als  $A(\cos t, \sin t)$ , dan:  $B = (\cos(t+\frac{1}{2}\pi), \sin(t+\frac{1}{2}\pi))$ ,  $C = (\cos(t+3\pi), \sin(t+3\pi))$ ,  $D = (\cos(-t), \sin(-t))$  (hulp punt),  $E = (\cos(-t+2\frac{1}{2}\pi), \sin(-t+2\frac{1}{2}\pi))$  en  $F(\cos(t+1\frac{1}{2}\pi), \sin(t+1\frac{1}{2}\pi))$ , dus  $\cos(t+\frac{1}{2}\pi) = -\sin t$  (punt B),  $\sin(t+3\pi) = -\sin t$  (punt C),  $\cos(-t+2\frac{1}{2}\pi) = \sin t$  (punt E) en  $\sin(t+1\frac{1}{2}\pi) = -\cos t$  (punt F).  
Je kunt ook de formules gebruiken, bijvoorbeeld:  $\cos(t+\frac{1}{2}\pi) = \langle \text{volgens 8} \rangle = \sin(-t) = \langle \text{volgens 1} \rangle = -\sin t$ , enzovoort.

7 b.  $\sin(x+\pi) = -\sin x$  en  $\sin(x+1\frac{1}{2}\pi) = -\sin(x+\frac{1}{2}\pi)$ , dus  $\sin x + \sin(x+\frac{1}{2}\pi) + \sin(x+\pi) + \sin(x+1\frac{1}{2}\pi) = 0$ , voor elke  $x$ .

8  $\sin^2 2x + \cos^2 2x = 1$  volgens (9) als je voor  $t=2x$  invult.

$(2\sin x)^2 + (2\cos x)^2 = 4\sin^2 x + 4\cos^2 x = 4$  volgens (9).

9  $\sin(x+\frac{1}{2}\pi) = \cos x$ ,  $\sin(x+\pi) = -\sin x$  en  $\sin(x+1\frac{1}{2}\pi) = -\cos x$ , dus  $\sin^2 x + \sin^2(x+\frac{1}{2}\pi) + \sin^2(x+\pi) + \sin^2(x+1\frac{1}{2}\pi) = \sin^2 x + \cos^2 x + (-\sin x)^2 + (-\cos x)^2 = 1 + 1 = 2$ .

10  $(1 + \cos x)(1 - \cos x) = 1 - \cos^2 x = \sin^2 x$ , volgens (9).

11 a. Uit (1) volgt  $\sin(3t-1) = -\sin(-3t+1)$ .  
b. Als je voor  $t=0$  neemt, krijg je  $\cos(-1) + \cos 1 = 2\cos 1 \neq 0$ , dus voor  $t=0$  klopt de formule niet. Als bijvoorbeeld  $3t-1 = \frac{1}{2}\pi$ , dus  $t = \frac{1}{6}\pi + \frac{1}{3}$ , krijg je  $\cos \frac{1}{2}\pi + \cos -\frac{1}{2}\pi = 0 + 0 = 0$ .

12  $\cos(x+\frac{1}{3}\pi) = \langle \text{volgens (7)} \rangle = \sin(\frac{1}{2}\pi - (x+\frac{1}{3}\pi)) = \sin(\frac{1}{6}\pi - x) = \langle \text{volgens (1)} \rangle = -\sin(x-\frac{1}{6}\pi)$

13  $\sin^2 \frac{5}{14}\pi = \cos^2 \frac{2}{14}\pi$  en  $\sin^2 \frac{4}{14}\pi = \cos^2 \frac{3}{14}\pi$ , dus  $\sin^2 \frac{2}{14}\pi + \sin^2 \frac{3}{14}\pi + \sin^2 \frac{4}{14}\pi + \sin^2 \frac{5}{14}\pi = \sin^2 \frac{2}{14}\pi + \cos^2 \frac{2}{14}\pi + \sin^2 \frac{3}{14}\pi + \cos^2 \frac{3}{14}\pi = 2$


14 b.  $\rho = -1$   
c. Volgt uit (9).

15  $2\text{nds} \sin .7 \approx 0.775$ , dus  $0,775$  en  $\pi - 0,775 \approx 2,366$   
 $2\text{nds} \sin -3 \approx -0.304\dots$ , dus  $\pi + 0,304\dots \approx 3,446$  en  $2\pi - 0,304\dots \approx 5,978$   
geen oplossing  
 $1\frac{1}{2}\pi \approx 4,712$

16  $2\pi + 0,411\dots \approx 6,695$ ;  $4\pi - 0,411 \approx 9,013$   
 $-6\pi + 0,411\dots \approx -18,438$ ;  $-5\pi - 0,411\dots \approx -16,119$

17  $2\text{nd} \cos .07 \approx 0.795$ , dus  $0,795$  en  $2\pi - 0,795 \approx 5,488$   
 $2\text{nd} \cos -3 \approx 1.875$ , dus  $1,875$  en  $2\pi - 1,875 \approx 4,408$   
geen oplossing  
 $\pi \approx 3,142$

18 a.



b.  $0, \frac{1}{3}\pi, \pi, 1\frac{2}{3}\pi$

19 a.  $\pi, \frac{2}{3}\pi$   
b.  $\sin 2 \cdot \frac{1}{5}\pi = \sin 3 \cdot \frac{1}{5}\pi$ , volgens (5).  
c.  $\frac{2}{5}\pi$   
d.  $0, \frac{1}{5}\pi, \frac{3}{5}\pi, \pi, 1\frac{2}{5}\pi$ , controleren zoals in b

20 a.  $2\pi, \pi$

b. Dan  $\sin x=0$  of  $\sin x=1$ , (vergelijk:  $a^2 = a \Leftrightarrow a^2 - a = 0 \Leftrightarrow a(a-1)=0 \Leftrightarrow a=0$  of  $a=1$ ), dus  $x=0, \pi, 2\pi, \frac{1}{2}\pi$ .

21 a.  $2\pi, \pi$

b. Dan  $\sin x=0$  of  $\sin x=\frac{1}{2}$ , dus  $x=0, \pi, 2\pi, \frac{1}{6}\pi, \frac{5}{6}\pi$ .

22 a.  $2\pi, \pi$

b.  $3\sin x=2-2\sin^2 x \Leftrightarrow 2\sin^2 x+3\sin x-2=0 \Leftrightarrow \sin x=-2$  of  $\sin x=\frac{1}{2}$  (vergelijk:  $2a^2+3a-2=0 \Leftrightarrow (2a-1)(a+2)=0 \Leftrightarrow a=\frac{1}{2}$  of  $a=-2$ )  $\Leftrightarrow x=\frac{1}{6}\pi, \frac{5}{6}\pi$

#### Paragraaf 4 De somformules

1 Nee.

2 b.  $(\frac{1}{4}\pi, \sqrt{2})$

3 a.  $(\frac{1}{2}\pi, 2); \pi$

4  $(2, 3), (-3, 6)$

5  $1; \sqrt{3}$

6 a.  $\vec{q} = (\cos(\frac{1}{2}\pi + \beta), \sin(\frac{1}{2}\pi + \beta));$

$\vec{v} = (\cos(\alpha + \beta), \sin(\alpha + \beta))$

b. Volgt uit (10) en (11).

c.  $(\cos(\alpha + \beta), \sin(\alpha + \beta)) = \cos \alpha \cdot (\cos \beta, \sin \beta) + \sin \alpha \cdot (-\sin \beta, \cos \beta) = (\cos \alpha \cdot \cos \beta, \cos \alpha \cdot \sin \beta) + (\sin \alpha \cdot -\sin \beta, \sin \alpha \cdot \cos \beta) = (\cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta, \cos \alpha \cdot \sin \beta + \sin \alpha \cdot \cos \beta)$

7 a.  $\sin(x + \frac{1}{4}\pi) = \sin x \cdot \cos \frac{1}{4}\pi + \cos x \cdot \sin \frac{1}{4}\pi = \frac{1}{2}\sqrt{2} \sin x + \frac{1}{2}\sqrt{2} \cos x$


b. Vermenigvuldig beide kanten uit a met  $\sqrt{2}$ .

8 Substitueer  $-\beta$  voor  $\beta$  in (12). Dan krijg je:  $\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cdot \cos -\beta - \sin \alpha \cdot \sin -\beta = \cos \alpha \cdot \cos \beta + \sin \alpha \cdot \sin \beta$ , vanwege (1) en (2).

Substitueer  $-\beta$  voor  $\beta$  in (13). Dan krijg je:  $\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cdot \cos -\beta + \cos \alpha \cdot \sin -\beta = \sin \alpha \cdot \cos \beta - \cos \alpha \cdot \sin \beta$ , vanwege (1) en (2).

9 Als je  $\pi$  voor  $\beta$  substitueert in (13), dan krijg je (3).  
Als je  $\pi$  voor  $\beta$  substitueert in (14), dan krijg je (4).  
Als je  $\frac{1}{2}\pi$  voor  $\alpha$  en  $\alpha$  voor  $\beta$  substitueert in (15), krijg je (7).  
Als je  $\frac{1}{2}\pi$  voor  $\alpha$  en  $\alpha$  voor  $\beta$  substitueert in (14), krijg je (8).  
Als je  $\alpha$  voor  $\beta$  substitueert in (14), krijg je (9).

10 a.



b.  $\cos \alpha = \sqrt{1 - (\frac{5}{13})^2} = \frac{12}{13}$ ;  $\sin \beta = \sqrt{1 - (\frac{12}{13})^2} = \frac{5}{13}$

c.  $\sin(\alpha + \beta) = \frac{3}{5} \cdot \frac{12}{13} + \frac{4}{5} \cdot \frac{5}{13} = \frac{16}{65}$

$\cos(\alpha - \beta) = \frac{4}{5} \cdot \frac{12}{13} - \frac{3}{5} \cdot \frac{5}{13} = \frac{33}{65}$

11 a. Vul  $x$  in voor  $\alpha$  en voor  $\beta$  in (13), dan krijg je (16).

Vul  $x$  in voor  $\alpha$  en voor  $\beta$  in (12), dan krijg je (17).

b.  $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = \cos^2 x - (1 - \cos^2 x) = 2\cos^2 x - 1$ ;  
 $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = (1 - \sin^2 x) - \sin^2 x = 1 - 2\sin^2 x$

12 a.  $2\sin^2 x = 1 - \cos 2x =$

$1 - \sin(\frac{1}{2}\pi - 2x) = 1 + \sin(2x - \frac{1}{2}\pi)$ , dus bijvoorbeeld  $a=1, b=-1, c=-2, d=\frac{1}{2}\pi$  of  $a=1, b=1, c=2$  en  $d=-\frac{1}{2}\pi (+k \cdot 2\pi)$ .

b.  $2\cos^2 x = 1 + \cos 2x = 1 + \sin(\frac{1}{2}\pi - 2x)$ , dus  $a=1, b=1, c=-2$  en  $d=\frac{1}{2}\pi (+k \cdot 2\pi)$ .


Er zijn weer meer mogelijkheden.

13  $(\sin x + \cos x)^2 = \sin^2 x + \cos^2 x + 2\sin x \cdot \cos x = 1 + \sin 2x$ , volgens (9) en (16).

14 a.  $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$ , dus  $\cos t = -0,6$

b. De positie is P.

c.  $x_P = \cos 2t = 1 - 2\sin^2 t = -0,28$  en  $y_P = \sin 2t = 2\sin t \cos t = -0,96$ .




15 a.  $\cos \alpha = \frac{1}{2}\sqrt{3}$  en  $\cos \beta = \frac{2}{3}\sqrt{2}$ , met behulp van  $\cos^2 \dots + \sin^2 \dots = 1$

b.  $\sin \gamma = \sin(\pi - (\alpha + \beta)) = \sin(\alpha + \beta)$  volgens (5),

en  $\sin(\alpha + \beta) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{2} + \frac{1}{2} \sqrt{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \sqrt{2} + \frac{1}{6} \sqrt{3}$ .

16 y-as




b.  $v_x=20$ ;  $v_y=40-10t$ , op  $t=0$  is  $\vec{v}=(20, 40)$ , dus hoek  $= 2\text{nd tan } \frac{40}{20} \approx 63,4^\circ$  en snelheid  $= \sqrt{20^2 + 40^2} = 20\sqrt{5}$ .

c. Dan is  $v_y=0$ , dus  $t=4$ , dit geeft het punt  $(80, 80)$ ; snelheidsvector  $= (20, 0)$ .

d.  $40t - 5t^2 = 0 \Leftrightarrow t=0$  of  $t=8$ , dus 8 sec;  $x(8) = 160$ ; 160 m.

e.  $\vec{v}(8) = (20, -40)$ , dus de snelheid is  $20\sqrt{5}$ .

17 a.



b.  $80T \cdot \sin \alpha - 5T^2 = 0 \Leftrightarrow T(80 \cdot \sin \alpha - 5T) = 0 \Leftrightarrow T = 0$  of  $T = 16 \cdot \sin \alpha$ , dus  $T = 16 \cdot \sin \alpha$ .


c.  $A = x(T) = 80T \cdot \cos \alpha = 80 \cdot 16 \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha = 640 \cdot \sin 2\alpha$  volgens (16).

$640 \cdot \sin 2\alpha$  is maximaal als  $\sin 2\alpha$  maximaal is; dit is het geval als  $\sin 2\alpha = 1$ , dus als  $\alpha = 45^\circ$ .

### Paragraaf 5 De afgeleide van sinus en cosinus

- 1 a. De snelheidsvector is in A: (0, 1); in B: (-1, 0); in C: (0, -1) en in D: (1, 0)  
 b. Je krijgt de grafiek van cos en van -sin.  
 d.  $\sin' = \cos$  en  $\cos' = -\sin$ .

2 a.



- b. Snelheidsvector is  $(\cos(t + \frac{1}{2}\pi), \sin(t + \frac{1}{2}\pi))$ ; volgens (10) en (11) is dat:  $(-\sin t, \cos t)$ .

3  $u'(t) = -100 \sin t$ . De absolute waarde hiervan is de eerste keer 50 als  $\sin t = \frac{1}{2}$  voor de eerste keer, dus  $t = 0,52$ .

- 4 •  $y = \sin^2 x = \sin x \cdot \sin x$ , met de productregel: dan  $y' = \cos x \cdot \sin x + \sin x \cdot \cos x = 2 \sin x \cdot \cos x$  of met de kettingregel:  $x \rightarrow \sin x = u \rightarrow u^2$ , dan  $y' = 2u \cdot \cos x = 2 \sin x \cdot \cos x$   
 •  $y = \cos^2 x$ , met productregel of kettingregel:  $x \rightarrow \cos x = u \rightarrow u^2$ , dan  $y' = 2u \cdot (-\sin x) = -2 \sin x \cdot \cos x$   
 •  $y = x \cdot \sin x$ , met de productregel:  $y' = 1 \cdot \sin x + x \cdot \cos x$   
 •  $y = x \cdot \sin^2 x$ , met de productregel:  $y' = 1 \cdot \sin^2 x + x \cdot 2 \sin x \cdot \cos x = \sin^2 x + 2x \cdot \sin x \cdot \cos x$

•  $y = \frac{x}{\cos x}$ , met de quotiëntregel:  

$$y' = \frac{1 \cdot \cos x - x \cdot (-\sin x)}{\cos^2 x} = \frac{\cos x + x \cdot \sin x}{\cos^2 x}$$

•  $y = \frac{\sin x}{\cos x}$ , met de quotiëntregel:  

$$y' = \frac{\cos x \cdot \cos x - \sin x \cdot (-\sin x)}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}$$

5 a.  $\cos(\alpha+7)$  (met de kettingregel)

b.  $\cos \alpha \cdot \cos 7 - \sin \alpha \cdot \sin 7$

(Opmerking:  $\frac{d}{d\alpha}(\sin \alpha \cdot \cos 7) = \cos \alpha \cdot \cos 7$  volgens de veelvoudregel)

c. Formule (12).

6 a.  $(-6 \sin 2t, 6 \cos 2t)$

b.  $\sqrt{36 \cos^2 2t + 36 \sin^2 2t} = \sqrt{36} = 6$

c. De hoeksnelheid is 2 rad/s, de straal van de baan is 3, dus snelheid =  $2 \cdot 3 = 6$  eenheden per s of:

één rondje duurt  $\pi$  sec, de baan is een cirkel met straal 3, heeft dus lengte  $6\pi$ , dus 6 eenh/sec.

7 a. De eenheidscirkel.

b. De ruimte tussen opeenvolgende punten van de baan die de GR met elkaar verbindt wordt steeds groter vanwege het kwadraat.

c.  $121/2\pi \approx 19,26$ , dus het kogeltje draait iets meer dan  $19\frac{1}{4}$  rondje, komt dus 20 keer in het hoogste punt van de eenheidscirkel en 19 keer in het meest linkse punt.

d. Snelheidsvector =  $(-2t \sin t^2, 2t \cos t^2) = 2t \cdot (-\sin t^2, \cos t^2)$ . De grootte van  $(-\sin t^2, \cos t^2)$  is 1, dus de snelheidsvector heeft grootte  $2t$ .

Anders: Na  $t$  seconden is  $t^2$  eenheden afgelegd, de snelheid is dan  $2t$ .

8 b.  $y = 0 \Leftrightarrow \sin x \cdot (\sin x + 1) = 0 \Leftrightarrow \sin x = 0$  of  $\sin x = -1 \Leftrightarrow x = 0, \pi, 1\frac{1}{2}\pi, 2\pi$

c.  $y' = 2 \sin x \cdot \cos x + \cos x = \cos x (2 \sin x + 1)$   
 $y' = 0 \Leftrightarrow \cos x = 0$  of  $\sin x = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}\pi, 1\frac{1}{2}\pi, 1\frac{5}{6}\pi, 1\frac{7}{6}\pi$

d. Maximale waarde 2 voor  $x = \frac{1}{2}\pi$ , minimale waarde  $-\frac{1}{4}$  voor  $x = 1\frac{1}{6}\pi$ , dus  $[-\frac{1}{4}, 2]$

e.  $y'(\pi) = -1$ , dus  $45^\circ$ .

9 a.  $f'(x) = 2 \sin x \cdot \cos x = \sin 2x$  en

$g'(x) = 2 \cdot \frac{1}{2} \sin 2x = \sin 2x$


b. De grafiek van de ene functie ontstaat uit de grafiek van de andere door een verticale verschuiving.

c. De functies verschillen een constante die je kunt vinden door voor  $x$  een getal in te vullen, bijvoorbeeld 0,  $f(0) = 0$  en  $g(0) = -\frac{1}{2}$ . De functie  $f$  is

dus  $\frac{1}{2}$  groter voor elke  $x$ , dus  $f(x) = g(x) + \frac{1}{2}$ , voor alle  $x$ .

- 10 a. De helling van de lijn door  $O(0,0)$  en het punt  $(x, \sin x)$ .  
 b. Dat is de groeisnelheid in  $0 = \sin' 0 = \cos 0$ .  
 c.  $\cos(0) = 1$ , dus  $\frac{\sin x}{x} \approx 1$ , dus  $\sin(x) \approx x$ .  
 d.  $\sin \frac{1}{2}x \approx \frac{1}{2}x$ ;  $\sin \sqrt{x} \approx \sqrt{x}$


- 11 a. In het plaatje hiernaast is  $h$  een hoogtelijnstuk;



$h = 1 \cdot \sin \alpha$ .

Oppervlakte driehoek  $= \frac{1}{2} \cdot \sin \alpha$ .

Voor het berekenen van de derde zijde, zie het plaatje hiernaast.



$\frac{1}{2}x = 1 \cdot \sin \frac{1}{2}\alpha$ , dus

$x = 2 \sin \frac{1}{2}\alpha$

b.  $\alpha = 30^\circ$ ;

oppervlakte  $= 12 \cdot \frac{1}{2} \cdot \sin 30^\circ = 3$ ;

omtrek  $= 12 \cdot 2 \cdot \sin 15^\circ = 6,21$ .

d. Oppervlakte  $= \frac{1}{2} n \cdot \sin \frac{2\pi}{n} \approx \frac{1}{2} n \cdot \frac{2\pi}{n} = \pi$ .

e. Omtrek  $= 2n \cdot \sin \frac{\pi}{n} \approx 2n \cdot \frac{\pi}{n} = 2\pi$ .

### Rekentechniek

- 1 a.  $\sin x = \sin \frac{1}{3}\pi \Leftrightarrow x = \frac{1}{3}\pi$  of  $x = \pi - \frac{1}{3}\pi = \frac{2}{3}\pi$   
 b.  $\sin x = \sin(x+2) \Leftrightarrow x = x+2 + k \cdot 2\pi$  of  $x = \pi - (x+2) + k \cdot 2\pi \Leftrightarrow x = \pi - x - 2 + k \cdot 2\pi \Leftrightarrow 2x = \pi - 2 + k \cdot 2\pi \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}\pi - 1 + k \cdot \pi$ , dus  $x = \frac{1}{2}\pi - 1$  of  $x = 1\frac{1}{2}\pi - 1$   
 c.  $\sin x = \sin 4x \Leftrightarrow x = 4x + k \cdot 2\pi$  of  $x = \pi - 4x + k \cdot 2\pi \Leftrightarrow x = k \cdot \frac{2}{5}\pi$  of  $x = \frac{1}{5}\pi + k \cdot \frac{2}{5}\pi$ . dit geeft:  
 $0, \frac{2}{5}\pi, 1\frac{1}{5}\pi, 2\pi, \frac{1}{5}\pi, \frac{3}{5}\pi, \pi, 1\frac{2}{5}\pi, 1\frac{4}{5}\pi$  tussen 0 en  $2\pi$ .  
 d.  $\sin x = -\sin x \Leftrightarrow \sin x = \sin -x \Leftrightarrow x = -x + k \cdot 2\pi$  of  $x = \pi - x + k \cdot 2\pi \Leftrightarrow 2x = k \cdot 2\pi$ , dus  $x = 0, \pi, 2\pi$   
 e.  $\cos x = \cos \frac{1}{3}\pi \Leftrightarrow x = \pm \frac{1}{3}\pi + k \cdot 2\pi$ , dus  $x = \frac{1}{3}\pi, 1\frac{2}{3}\pi$   
 f.  $\cos x = \cos(x+2) \Leftrightarrow x = \pm(x+2) + k \cdot 2\pi \Leftrightarrow x = -x - 2 + k \cdot 2\pi \Leftrightarrow x = -1 + k \cdot \pi$ , dus  $x = \pi - 1, 2\pi - 1$   
 g.  $\cos x = \cos 4x \Leftrightarrow x = \pm 4x + k \cdot 2\pi \Leftrightarrow -3x = k \cdot 2\pi$  of  $5x = k \cdot 2\pi$ , dus  $x = 0, \frac{2}{5}\pi, 1\frac{1}{5}\pi, 2\pi, \frac{2}{5}\pi, \frac{4}{5}\pi, 1\frac{1}{5}\pi, 1\frac{3}{5}\pi$ .  
 h.  $\cos x = -\cos x \Leftrightarrow \cos x = \cos(x+\pi) \Leftrightarrow x = \pm(x+\pi) + k \cdot 2\pi \Leftrightarrow x = -x - \pi + k \cdot 2\pi \Leftrightarrow x = -\frac{1}{2}\pi + k \cdot \pi$ , dus  $x = \frac{1}{2}\pi, 1\frac{1}{2}\pi$   
 i.  $\sin x = \cos \frac{1}{3}\pi \Leftrightarrow \cos(\frac{1}{2}\pi - x) = \cos \frac{1}{3}\pi \Leftrightarrow \frac{1}{2}\pi - x = \pm \frac{1}{3}\pi + k \cdot 2\pi \Leftrightarrow x = \frac{1}{6}\pi + k \cdot 2\pi$  of  $x = \frac{5}{6}\pi + k \cdot 2\pi$ , dus  $x = \frac{1}{6}\pi, \frac{5}{6}\pi$   
 j.  $\sin x = \cos x \Leftrightarrow \cos(\frac{1}{2}\pi - x) = \cos x \Leftrightarrow \frac{1}{2}\pi - x = \pm x + k \cdot 2\pi \Leftrightarrow -2x = -\frac{1}{2}\pi + k \cdot 2\pi \Leftrightarrow x = \frac{1}{4}\pi + k \cdot \pi \Leftrightarrow x = \frac{1}{4}\pi, 1\frac{1}{4}\pi$

- k.  $\sin x = -\cos x \Leftrightarrow \sin -x = \cos x \Leftrightarrow \cos(\frac{1}{2}\pi + x) = \cos x \Leftrightarrow \frac{1}{2}\pi + x = \pm x + k \cdot 2\pi \Leftrightarrow 2x = -\frac{1}{2}\pi + k \cdot 2\pi \Leftrightarrow x = -\frac{1}{4}\pi + k \cdot \pi \Leftrightarrow x = \frac{3}{4}\pi, 1\frac{3}{4}\pi$   
 l.  $\sin x = \cos(2x) \Leftrightarrow \cos(\frac{1}{2}\pi - x) = \cos(2x) \Leftrightarrow \frac{1}{2}\pi - x = \pm 2x + k \cdot 2\pi \Leftrightarrow -3x = -\frac{1}{2}\pi + k \cdot 2\pi$  of  $x = -\frac{1}{6}\pi + k \cdot \frac{2}{3}\pi$  of  $x = -\frac{1}{2}\pi + k \cdot 2\pi \Leftrightarrow x = \frac{1}{6}\pi, \frac{5}{6}\pi, 1\frac{1}{2}\pi$

- 2 a.  $\sin x = \sin(3x - 2\frac{1}{4}\pi) \Leftrightarrow x = 3x - 2\frac{1}{4}\pi + k \cdot 2\pi$  of  $x = \pi - 3x + 2\frac{1}{4}\pi + k \cdot 2\pi \Leftrightarrow -2x = -2\frac{1}{4}\pi + k \cdot 2\pi$  of  $4x = \pi + 2\frac{1}{4}\pi + k \cdot 2\pi \Leftrightarrow x = 1\frac{1}{8}\pi + k \cdot \pi$  of  $x = \frac{13}{16}\pi + k \cdot \frac{1}{2}\pi$ ,

dus  $x = \frac{1}{8}\pi, 1\frac{1}{8}\pi, \frac{5}{16}\pi, \frac{13}{16}\pi, 1\frac{5}{16}\pi, 1\frac{13}{16}\pi$

b.  $\cos(x + \frac{1}{4}\pi) = \cos(2x - 1\frac{1}{4}\pi) \Leftrightarrow x + \frac{1}{4}\pi = \pm(2x - 1\frac{1}{4}\pi) + k \cdot 2\pi \Leftrightarrow -x = -1\frac{1}{2}\pi + k \cdot 2\pi$  of  $3x = \pi + k \cdot 2\pi \Leftrightarrow x = 1\frac{1}{2}\pi + k \cdot 2\pi$  of  $x = \frac{1}{3}\pi + k \cdot \frac{2}{3}\pi$ , dus  $x = \frac{1}{3}\pi, \pi, 1\frac{2}{3}\pi, 1\frac{1}{2}\pi$

c.  $\sin(x - \frac{5}{6}\pi) = \cos x \Leftrightarrow \cos(\frac{1}{3}\pi - x) = \cos x \Leftrightarrow 1\frac{1}{3}\pi - x = \pm x + k \cdot 2\pi \Leftrightarrow -2x = -1\frac{1}{3}\pi + k \cdot 2\pi \Leftrightarrow x = \frac{2}{3}\pi + k \cdot \pi$ , dus  $x = \frac{2}{3}\pi, 1\frac{2}{3}\pi$

d.  $\sin x = -\cos \frac{1}{7}\pi \Leftrightarrow \cos(\frac{1}{2}\pi - x) = \cos 1\frac{1}{7}\pi \Leftrightarrow \frac{1}{2}\pi - x = \pm 1\frac{1}{7}\pi + k \cdot 2\pi \Leftrightarrow x = -\frac{9}{14}\pi + k \cdot 2\pi$  of

$x = 1\frac{9}{14}\pi + k \cdot 2\pi$ , dus  $x = 1\frac{5}{14}\pi, 1\frac{9}{14}\pi$

e.  $\sin(x + \frac{1}{4}\pi) = -\cos x \Leftrightarrow \cos(\frac{1}{4}\pi - x) = \cos(x + \pi) \Leftrightarrow \frac{1}{4}\pi - x = \pm(x + \pi) + k \cdot 2\pi \Leftrightarrow -2x = \frac{3}{4}\pi + k \cdot 2\pi \Leftrightarrow x = -\frac{3}{8}\pi + k \cdot 2\pi$ , dus  $x = \frac{5}{8}\pi, 1\frac{5}{8}\pi$

f.  $\sin 2x = \cos 3x \Leftrightarrow \cos(\frac{1}{2}\pi - 2x) = \cos 3x \Leftrightarrow \frac{1}{2}\pi - 2x = \pm 3x + k \cdot 2\pi \Leftrightarrow -5x = -\frac{1}{2}\pi + k \cdot 2\pi$  of  $x = -\frac{1}{10}\pi + k \cdot \frac{2}{5}\pi$  of  $x = 1\frac{1}{2}\pi$ , dus  $x = \frac{1}{10}\pi, \frac{1}{2}\pi, \frac{9}{10}\pi, 1\frac{3}{10}\pi, 1\frac{1}{2}\pi, 1\frac{7}{10}\pi$

- 3 a.  $\cos^2 x + \sin x = 1 \Leftrightarrow k \cdot \pi, \frac{1}{2}\pi + k \cdot 2\pi$

b.  $\cos 2x + \cos x + 1 = 0 \Leftrightarrow 2 \cos^2 x - 1 + \cos x + 1 = 0 \Leftrightarrow 2 \cos^2 x + \cos x = 0 \Leftrightarrow \cos x(2 \cos x + 1) = 0 \Leftrightarrow \cos x = 0$  of  $\cos x = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow$

$x = \frac{1}{2}\pi + k \cdot \pi, \frac{2}{3}\pi + k \cdot 2\pi, \frac{4}{3}\pi + k \cdot 2\pi$

c.  $3 \sin x + \cos^2 x = 3 \Leftrightarrow 3 \sin x + 1 - \sin^2 x = 3 \Leftrightarrow \sin^2 x - 3 \sin x + 2 = 0 \Leftrightarrow (\sin x - 2)(\sin x - 1) = 0 \Leftrightarrow \sin x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}\pi + k \cdot 2\pi$

d.  $\cos 2x = 1 - \sin x \Leftrightarrow 1 - 2 \sin^2 x = 1 - \sin x \Leftrightarrow \sin x(2 \sin x - 1) = 0 \Leftrightarrow \sin x = 0$  of  $\sin x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = k \cdot \pi, \frac{1}{6}\pi + k \cdot 2\pi, \frac{5}{6}\pi + k \cdot 2\pi$

- 4 a.  $\frac{\sin(x + \frac{1}{3}\pi)}{\sin(x - \frac{1}{3}\pi)} = \frac{\sin x \cdot \cos \frac{1}{3}\pi + \cos x \cdot \sin \frac{1}{3}\pi}{\sin x \cdot \cos \frac{1}{3}\pi - \cos x \cdot \sin \frac{1}{3}\pi}$

$= \frac{\frac{1}{2} \sin x + \frac{1}{2} \sqrt{3} \cos x}{\frac{1}{2} \sin x - \frac{1}{2} \sqrt{3} \cos x} = \frac{\sin x + \sqrt{3} \cos x}{\sin x - \sqrt{3} \cos x}$

b.  $\frac{(\sin x + \cos x)^2}{(\sin x - \cos x)^2} = \frac{\sin^2 x + \cos^2 x + 2 \sin x \cdot \cos x}{\sin^2 x + \cos^2 x - 2 \sin x \cdot \cos x}$

$= \frac{1 + \sin 2x}{1 - \sin 2x}$

$$\text{c. } \frac{\cos 2x}{\sin x + \cos x} = \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\sin x + \cos x} = \frac{(\cos x - \sin x)(\cos x + \sin x)}{\sin x + \cos x} = \cos x - \sin x$$

$$\text{d. } \frac{\cos 2x}{\cos x} = \frac{2\cos^2 x - 1}{\cos x} = 2\cos x - \frac{1}{\cos x}$$

$$\text{e. } \frac{\cos 2\left(x - \frac{1}{4}\pi\right)}{\cos\left(x - \frac{1}{2}\pi\right)} = \frac{\cos\left(2x - \frac{1}{2}\pi\right)}{\cos\left(x - \frac{1}{2}\pi\right)} = \frac{\sin 2x}{\sin x} = \frac{2 \cdot \sin x \cdot \cos x}{\sin x} = 2 \cdot \cos x$$

5 a.  $(\sin x + \cos x)^2 = 1 + \cos x \Leftrightarrow \sin^2 x + \cos^2 x + 2\sin x \cdot \cos x = 1 + \cos x \Leftrightarrow 2\sin x \cdot \cos x = \cos x \Leftrightarrow \cos x = 0$  of  $\sin x = \frac{1}{2}$   
 $\Leftrightarrow x = \frac{1}{2}\pi + k \cdot 2\pi$  of  $x = \frac{5}{6}\pi + k \cdot 2\pi$  of

$$x = \frac{1}{6}\pi + k \cdot 2\pi$$

b.  $2\cos^2 x + \sin 2x = 0 \Leftrightarrow 2\cos^2 x + 2\sin x \cdot \cos x = 0 \Leftrightarrow \cos x = 0$  of  $\cos x = -\sin x$

$$\Leftrightarrow x = \frac{1}{2}\pi + k \cdot \pi$$
 of  $x = -\frac{1}{4}\pi + k \cdot \pi$

c.  $2\sin^2 x = 1 - \cos\left(x + \frac{1}{4}\pi\right) \Leftrightarrow 2\sin^2 x - 1 = -\cos\left(x + \frac{1}{4}\pi\right) \Leftrightarrow -\cos 2x = -\cos\left(x + \frac{1}{4}\pi\right) \Leftrightarrow 2x = \pm\left(x + \frac{1}{4}\pi\right) + k \cdot 2\pi \Leftrightarrow$

$$x = \frac{1}{4}\pi + k \cdot 2\pi$$
 of  $3x = -\frac{1}{4}\pi + k \cdot 2\pi \Leftrightarrow$

$$x = \frac{1}{4}\pi + k \cdot 2\pi$$
 of  $x = -\frac{1}{12}\pi + k \cdot \frac{2}{3}\pi$

d.  $4\sin^3 x = 3\sin 2x \Leftrightarrow 4\sin^3 x = 3 \cdot 2\sin x \cdot \cos x \Leftrightarrow \sin x = 0$  of  $4\sin^2 x = 6\cos x \Leftrightarrow x = k \cdot \pi$  of

$$4 - 4\cos^2 x = 6\cos x \Leftrightarrow$$

$$x = k \cdot \pi$$
 of  $(\cos x + 2)(2\cos x - 1) = 0 \Leftrightarrow$

$$x = k \cdot \pi$$
 of  $x = \pm\frac{1}{3}\pi + k \cdot 2\pi$ .

e.  $\cos\left(x + \frac{1}{4}\pi\right) \cdot \cos\left(x - \frac{1}{4}\pi\right) = \sin x \cdot \cos x \Leftrightarrow$

$$\left(\cos x \cdot \frac{1}{2}\sqrt{2} - \sin x \cdot \frac{1}{2}\sqrt{2}\right)\left(\cos x \cdot \frac{1}{2}\sqrt{2} + \sin x \cdot \frac{1}{2}\sqrt{2}\right) = \sin x \cdot \cos x \Leftrightarrow \cos^2 x - \sin^2 x = 2\sin x \cdot \cos x \Leftrightarrow$$

$$\cos 2x = \sin 2x \Leftrightarrow x = \frac{1}{8}\pi + k \cdot \frac{1}{2}\pi$$

6 a.  $\cos^4 x - \sin^4 x = (\cos^2 x - \sin^2 x) \cdot (\cos^2 x + \sin^2 x) = (\cos^2 x - \sin^2 x) \cdot 1 = \cos^2 x - \sin^2 x$

b.  $\sin^6 x + 3\sin^2 x \cos^2 x + \cos^6 x = \sin^6 x + 3\sin^2 x(1 - \sin^2 x) + (1 - \sin^2 x)^3 = \sin^6 x + 3\sin^2 x - 3\sin^4 x + 1 - 3\sin^2 x + 3\sin^4 x - \sin^6 x = 1$

c.  $\sin(x+y)\sin(x-y) = (\sin x \cos y + \cos x \sin y)(\sin x \cos y - \cos x \sin y) = \sin^2 x \cos^2 y - \cos^2 x \sin^2 y =$

$$(1 - \cos^2 x)\cos^2 y - \cos^2 x(1 - \cos^2 y) =$$

$$\cos^2 y - \cos^2 x \cdot \cos^2 y - \cos^2 x + \cos^2 x \cdot \cos^2 y =$$

$$\cos^2 y - \cos^2 x, \text{ dus}$$

$$\cos^2 y - \sin(x+y)\sin(x-y) - \cos^2 x = 0$$